



U Zagrebu, 29.05.2018.

PRIOPĆENJE ZA JAVNOST

Predmet: Ospice u Hrvatskoj

Vežano uz aktualni slućaj obolijevanja muškarca u Dubrovniku od ospica, Hrvatska udruga roditelja aktivista (HURA) istiće da pojedini hrvatski mediji, i to ne prvi puta, šire paniku od ospica. Na danas održanoj konferenciji za novinare predstavnici Opće bolnice Dubrovnik i Zavoda za javno zdravstvo Dubrovaćko-neretvanske Źupanije nisu naveli cjepni status oboljelog. No, u medijskim izvještajima u slućaju obolijevanja od ospica često se neodgovorno ponavlja pretpostavka da su svi oboljeli necijepljeni i neosnovano zakljućuje da su isti krivci za bolest. Ono što se javnosti uporno prešućuje je soj virusa koji uzrokuje ospice. Razlog tome zasigurno leŹi i u činjenici kako je mogući uzročnik ospica i njihovog daljeg širenja upravo cjepni soj virusa, što i potvrđuju brojna znanstvena istraŹivanja izvedena i u Hrvatskoj (istraŹivanje iz Hrvatske: <https://www.eurosurveillance.org/content/10.2807/ese.15.35.19652-en>) i u svijetu.

Strah od ospica se kroz medije već godinama reciklira isticanjem i ponavljanjem tvrdnji o prijetećoj epidemiji. Epidemija ne nastupa senzacionalistićkim isticanjem te rijeći u naslovima medijskih objava, već onda kada ministar zdravstva Republike Hrvatske istu proglasi temeljem Zakona o zaštiti pućanstva od zaraznih bolesti (ćl. 2., st. 4. ZZPZB, NN br. 130/2017). Pojedinaćni i malobrojni slućajevi ospica zadnjih su se desetljeća javljali i unatoć visokoj procijepljenosti i u nas i u okruŹenju, primjerice u Srbiji. S druge strane, niski cjepni obuhvat u Dubrovaćko – neretvanskoj Źupaniji, odavno je već trebao proizvesti epidemiju. To se ne slaŹe s onim što nam o kolektivnom imunitetu govore stručnjaci za cijepljenje.

Prije pojave cjepiva protiv ospica oćekivalo se da se gotovo svaka osoba u djetinjstvu zarazi ospicama, kako bi razvila i stekla trajni imunitet. Takav stav podupirali su i preporučivali i vodeći medicinski autoriteti, koji su znali da su ospice blaga djećja bolest koja se rijetko komplicira. Iznimno su rijetko obolijevala djeca mlađa od godinu dana, jer su ona zadržavala pasivni imunitet dobiven u majćinoj utrobi ili dojenjem. Epidemiologija bolesti se promijenila nakon uvođenja obaveznog cijepjenja na naćin da je porastao broj oboljelih u kasnijoj mladenaćkoj dobi, a u novije vrijeme i među odraslima, jer je "imunitet" stećen cijepljenjem vremenski ogranićen, a u odrasloj dobi je veća vjerojatnost da bolest ima teŹe posljedice. Obavezno cijepljenje je povećalo

Vrbani 17, 10 000 Zagreb

e-mail: hura.cpi@gmail.com www.cijepjenje.info

OIB: 85561197096 Źiro raćun IBAN: HR9823600001102643002



učestalost bolesti u najrizičnijim skupinama (mladi i odrasli), a smanjilo njezino pojavljivanje u najmanje rizičnim skupinama (mala djeca). Otvara se pitanje o kojem kolektivnom imunitetu zapravo govorimo kad je evidentno da dosadašnja politika obavezne imunizacije, koja se oslanja isključivo na cijepljenje djece, nije urodila plodom?

Puno se medijske pozornosti godinama posvećuje strašenju javnosti s epidemijama ospica, dok o postojećim nuspojavama cjepiva i oštećenjima djece od istih u medijima nema ni riječi. Senzacionalističkim isticanjem pojedinačnog slučaja obolijevanja od ospica skreće se pažnja sa stvarne epidemije koja vlada u Hrvatskoj, epidemije bolesti koje brojni roditelji, ali i sve više zdravstvenih stručnjaka te sudskih presuda dovode u direktnu vezu s cijepljenjem. Podsjećamo da se upravo predstojeći 3. lipnja obilježava kao Međunarodni dan svjesnosti o oštećenima od cjepiva.

Hrvatska udruga roditelja aktivista
Ivana Delaš, predsjednica

Evo što proizvođač cjepiva protiv ospica, zaušnjaka i rubele navodi u uputi za primjenu:

MOGUĆE NUSPOJAVE:

- crvenilo na mjestu uboda
- povišena temperatura (38°C ili viša)
- bol i otekline na mjestu uboda
- povišena temperatura (viša od 39,5 °C)
- osip (točkice)
- infekcije gornjih dišnih putova
- infekcija srednjeg uha
- oticanje limfnih žlijezda (u vratu, pazuhu ili preponama)
- gubitak teka
- razdražljivost
- neuobičajeni plač
- nemogućnost spavanja (nesanica)
- crvenilo, iritacija i suzenje očiju (konjunktivitis)

Vrbani 17, 10 000 Zagreb

e-mail: hura.cpi@gmail.com www.cijepljenje.info

OIB: 85561197096 Žiro račun IBAN: HR9823600001102643002



- bronhitis
- kašalj
- oticanje parotidnih žlijezda (podusne žlijezde slinovnice).
- proljev
- povraćanje
- konvulzije koje prate vrućicu
- bol i upala zglobova
- točkasto krvarenje ili krvarenje u obliku mrljica ili pojava modrica češće nego je normalno zbog smanjenja broja krvnih pločica (trombocita)
- neočekivane po život opasne alergijske reakcije
- upala moždanih ovojnica, mozga, leđne moždine i perifernih živaca, sindrom GuillainBarre (uzlazna paraliza sve do paralize dišnog sustava)
- Kawasakijev sindrom (glavni znakovi bolesti su primjerice: povišena temperatura, osip kože, oticanje limfnih žlijezda, upala i osip sluznica usta i grla)
- erythema multiforme (simptomi su crvene mrlje, često uz svrbež, slične osipu kod morbila, koje se najprije javljaju na udovima, a ponekad na licu ili tijelu)

U rijetkim slučajevima Vi ili Vaše dijete možete iskusiti simptome slične parotitisu ili morbilima. Zabilježena su izolirana izvješća o prolaznom bolnom oticanju testisa nakon cijepljenja.

AKO PRIMIJETITE BILO KOJU NUSPOJAVU POTREBNO JE OBAVIJESTITI LIJEČNIKA ILLI LJEKARNIKA.

Nuspojava	Učestalost
<i>Infekcije i infestacije</i>	
nazofaringitis, infekcije gornjih dišnih puteva ili virusne infekcije	manje često
aseptički meningitis†, atipični oblik morbila, epididimitis, orhitis, otitis media, parotitis, rinitis, subakutni sklerozirajući panencefalitis†	nepoznata
<i>Poremećaji krvi i limfnog sustava</i>	
regionalna limfadenopatija, trombocitopenija	nepoznata
<i>Poremećaji imunološkog sustava</i>	
anafilaktoidna reakcija, anafilaksija i slične pojave poput angioneurotskog edema, edema lica i perifernih edema	

Vrbani 17, 10 000 Zagreb

e-mail: hura.cpi@gmail.com www.cijepljenje.info

OIB: 85561197096 Žiro račun IBAN: HR9823600001102643002



	nepoznata
<i>Psihijatrijski poremećaji</i>	
razdražljivost	nepoznata
<i>Poremećaji živčanog sustava</i>	
afebrilne konvulzije ili napadaji, ataksija, omaglice, encefalitis†, encefalopatija†, febrilne konvulzije (u djece), Guillain-Barreov sindrom, glavobolja, encefalitis s inkluzijskim tjelešcima nakon morbila (MIBE) (vidjeti dio 4.3), očna paraliza, optički neuritis, parestezija, polineuritis, polineuropatija, retrobulbarni neuritis, sinkopa	nepoznata
<i>Poremećaji oka</i>	
konjuktivitis, retinitis	nepoznata
<i>Poremećaji uha i labirinta</i>	
senzorička gluhoća	nepoznata
<i>Poremećaji dišnog sustava, prsišta i sredoprjsja</i>	
rinoreja	manje često
bronhospazam, kašalj, upala pluća, pneumonitis (vidjeti dio 4.3), grlobolja	nepoznata
<i>Poremećaji probavnog sustava</i>	
proljevi ili povraćanje	manje često
mučnina	nepoznata
<i>Poremećaji kože i potkožnog tkiva</i>	
morbiliformni osip ili drugi oblici osipa	često
urtikarija	manje često

Vrbani 17, 10 000 Zagreb

e-mail: hura.cpi@gmail.com www.cijepljenje.info

OIB: 85561197096 Žiro račun IBAN: HR9823600001102643002



panikulitis, purpura, induracije kože, Stevens-Johnsonov sindrom, pruritus	nepoznata
<i>Poremećaji mišićno-koštanog sustava i vezivnog tkiva</i>	
artritis† i/ili artralgiya† (obično prolazna i rijetko kronična), mialgija	nepoznata
<i>Opći poremećaji i reakcije na mjestu primjene</i>	
vrućica (38,5°C ili viša), eritem na mjestu injekcije, bol na mjestu injekcije i oticanje na mjestu injekcije	vrlo često
podljevi na mjestu injekcije	često
osip na mjestu injekcije	manje često
Nuspojava	Učestalost
kratkotrajno pečenje i/ili bockanje na mjestu injekcije, vrućica (38,5 °C ili viša), opća slabost, papilitis, periferni edemi, oticanje, osjetljivost na dodir, vezikule na mjestu injekcije, oticanje i žarenje na mjestu injekcije	nepoznata
<i>Krvožilni poremećaji</i>	
vaskulitis	nepoznata

Vrbani 17, 10 000 Zagreb

e-mail: hura.cpi@gmail.com www.cijepljenje.info

OIB: 85561197096 Žiro račun IBAN: HR9823600001102643002